

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 5 - 6 - 70 068490

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 - 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE 25 Francs

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.P. LYON 340512 A.

Bulletin n° II7 de JUIN 1970.

4 JUIN 1970

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Il faut maintenir la protection car la sortie de taches sur pommiers et, dernièrement, sur poiriers, ont été particulièrement nombreuses fin mai et début juin. Les risques de projection d'ascospores aux prochaines pluies demeurent importants.

OIDIUM DU POMMIER : Renouveler les traitements, éliminer et brûler les poasses oïdiées.

ARAIGNEES ROUGES : Surveiller l'évolution de ce parasite dont la première ponte d'été va bientôt arriver à éclosion.

CARPOCAPSE DES POMMES : Les sorties d'adultes en cage d'élevage sont très nombreuses mais il faut attendre avant de faire la première pulvérisation.

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Rappel; utiliser la Doguadine au cas où la protection reste indispensable à moins de 15 jours de la récolte.

RAVAGEURS A SURVEILLER : Charançons, chenilles défeuillantes, pucerons divers.

PETITS FRUITS

OIDIUM AMERICAIN SUR CASSISSIER : Les premières taches sont apparues. Il convient donc d'effectuer un ~~premier~~ premier traitement contre cette maladie.

On utilisera soit le dinocap (25 g de matière active à l'hectolitre), le drazoxolon (80 gr/hl) ou le bénomyl (30 gr/hl). Ce dernier produit est également efficace contre l'anthracnose et s'est avéré être dans les essais de 1969 le meilleur antioïdium lorsque les traitements sont espacés. Le drazoxolon ne peut être utilisé dans le mois qui précède la récolte.

POMMES DE TERRE

DORYPHORE : De nombreuses pontes ayant été observées, il faut surveiller les cultures et traiter dès que les larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

Certaines régions (Auxonne notamment) connaissent des échecs de traitement avec le Lindane. Dans des cas semblables choisir un autre insecticide sur la liste des pesticides publiée en mars, bulletin n° II4.

Dernière note : Supplément n° 2 au bulletin n° II6 de Mai 1970.

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés
des Avertissements agricoles.

Imprimerie de la Station d'Avertissements de "Bourgogne & Franche-Comté". Le Directeur-Gérant :
L. BOUYX.

P305